



Lúa Đông Xuân 2017-2018 giai đoạn đẻ nhánh

Lúa Đông Xuân hiện nay đang trong giai đoạn đẻ nhánh, các loại cây trồng khác trong giai đoạn cây con, phát triển thân, lá đẻ ra hoa. Để giúp bà con nông dân chủ động trong công tác quản lý sâu bệnh và tình hình dịch hại trên cây trồng giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, UBND xã Tam An thông báo một số nội dung về chăm sóc và phòng trừ dịch hại trên cây trồng như sau:

1. Biện pháp chăm sóc cây trồng

a) Đối với cây lúa

Kịp thời tưới nước và bón phân thúc đúng thời kỳ để lúa đẻ nhánh kịp trung; khi bón thúc cần chú ý bón đạm và cân đối N-P-K để giúp cây lúa đẻ nhánh tốt, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh và chống rét cho lúa. Áp dụng biện pháp tưới nước “tối – khô xen kẽ” giai đoạn lúa đẻ nhánh.

Đặc điểm những ruộng đã bị ngập nước thu hoạch sớm có biểu hiện như: gốc phình to, cây đùn lùn, xoắn ngọn hoặc những ruộng bị ngập nước lâu có hiện tượng - vàng sinh lý thì cần thay nước từ 1-2 lần để giải độc, sau đó bón bổ sung thêm phân DAP và phun phân qua lá để lúa mau hồi phục.

b) Đặc điểm cây rau màu

Tranh thủ thời tiết thuận lợi khi trên ruộng sản xuất diện tích còn lại; thời vụ cho sản xuất ngô, rau màu các loại còn dài, cần bố trí sản xuất hợp lý diện tích.

Tưới nước, đẻ nhánh cây để đảm bảo mật độ phù hợp trên ruộng.

Bón phân thúc kịp thời, kết hợp với việc làm cỏ, lên luống, xới xáo phá váng (nhất là sau mưa) để cây trồng sinh trưởng phát triển tốt.

Tùy từng loại cây trồng và giai đoạn sinh trưởng, chú ý tưới nước để đảm bảo độ ẩm cho cây phát triển.

2. Biện pháp quản lý dịch hại

a) Cây lúa

- **Đặc điểm của bệnh vàng:** Hiện nay, bệnh vàng đang gây hại trên lúa đẻ trà và sớm tiếp tục gây hại trên lúa sớm muộn thời gian tới, các bệnh có nấm mốc cao. Để hạn chế phát sinh gây hại,

thu hoạch nên áp dụng biện pháp công: diệt trừ cỏ dại, nhện, sâu bệnh trên ruộng, mùa vụ và tiêu diệt. Khi mật độ cao có thể dùng máy phun thuốc diệt cỏ.

- **Đi vùi chuột:** Chuột gây hại mùa màng trong thời gian dài, cần tìm kiếm diệt chuột bằng nhử bẫy (bẫy lồng, bẫy kẹp, bẫy bán nguyệt...); đánh bắt bằng thuốc sinh học, sinh hóa, hóa học (nên dùng bả sinh học như Biorat...). Khi bắt bẫy, cần chú ý đảm bảo an toàn cho người và dùng vợt chặn thối.

- **Đi vùi muỗi năn (giống muỗi nhà):** Nhện và Đông Xuân gần đây muỗi năn có chi phí hàng phát triển, cần bắt có mật độ cao làm ảnh hưởng đáng kể đến năng suất lúa. Vì vậy, cần theo dõi khi bắt muỗi năn sớm ra ruộng ngày 01/02 đến ngày 15/02/2018. Nhện vùng phát hiện có muỗi năn ra ruộng thì có thể dùng các loại thuốc diệt trừ muỗi phun ruộng: Padan 95SP, Regent 5Sc... diệt muỗi ruộng có thể dùng các loại thuốc trừ sâu diệt muỗi ruộng.

- **Đi vùi rầy lưng trắng và bọ nhùn sọc đen:** Cần tăng cường công tác kiểm tra ruộng nhện phát hiện kịp thời để phát sinh cỏ rầy lưng trắng và bọ nhùn sọc đen, cần bắt chú ý ruộng vùng đã xác định có bọ nhùn trên lúa chết Hè Thu 2017. Khi phát hiện có triệu chứng bọ nhùn sọc đen thì báo ngay UBND xã thông qua Ban nông nghiệp để kịp thời báo cáo và phối hợp với Trung tâm khuyến nông nghiệp huyện kiểm tra, lấy mẫu giám định bọ nhùn; hướng dẫn cho bà con nhện vùi ruộng cây lúa bọ nhùn, cần dùng bả diệt cây lúa khế (nhuộm xỏ ra bọ nhùn), dùng vợt phun thuốc trừ rầy lưng trắng trên ruộng bọ nhùn và ruộng chân ruộng xung quanh.

Ngoài ra cần chú ý bắt, ruộng diệt cỏ nổi trên lúa sọc mu; sâu phao; sâu keo trà chính.

b) Cây rau màu

- **Đi vùi các loại sâu ăn lá, cần thân (sâu xám, sâu xanh, sâu khoang..):** khi mật độ thấp nên dùng biện pháp công như thu bắt, ngắt trừ cỏ..., cần dùng thuốc bả hoặc vợt diệt phun ruộng khi sâu có mật độ cao (phung khi sâu tuổn). Dùng máy trong các loại thuốc sau: Proclaim 1.9 EC, Radiant 60SC, Dylan 2EC... diệt phun ruộng.

- **Đi vùi bệnh lùn còi ròi**: Theo dõi và phát hiện bệnh sớm, nếu bệnh phát sinh gây hại thì dùng mật trong các loại thuốc như: **Validacin 3L, 5L (Va-li-đa-xin), Anvil 5 SC (An-vin), Monceren 250SC (Môn-xê-ren)**...để phòng trừ.

- **Đi vùi bệnh phấn trắng**: Phòng trừ bằng các loại thuốc như: Score 250 EC, Daconil 75WP, Nativo 750WG....

- **Đi vùi bệnh sùng mai trên cây họ bí**(kh qua, dưa leo, bầu, bí...): Cần ngắt bỏ các lá già, lá già, bỏ phần bệnh để hạn chế lây lan. Khi có bệnh gây hại, dùng các loại thuốc có hoạt chất Metalaxyl (Metaxyl 25 WP, Ridomin Gold 68 WG...) hoặc Aliette 800WG để phòng trừ.

- **Đi vùi bệnh héo rũ vi khuẩn**: Nên tăng cường các biện pháp canh tác (thoát nước, xới váng, tiêu hủy cây bệnh...), có thể dùng các loại thuốc như: **Kasumin 2L (Ka-su-min), New kasuran 16.6 BTN (Niu ka-su-ren), Staner 20WP (S-ten-n)**...để phòng trừ.

Lưu ý: Đi vùi các loại rau đậu thực phẩm, chế biến dùng các loại thuốc được phép được sử dụng trên cây rau và chú ý thời gian cách ly của thuốc để sản phẩm rau thu hoạch đảm bảo an toàn.

Đề nghị Mật trọt, các Hội, đoàn thể xã, 03 HTX NN và Ban nhân các thôn thị trấn xuyên tuyên truyền, phổ biến nội dung thông báo này để hướng dẫn nhân dân chăm sóc, quản lý dịch hại trên đồng ruộng kịp thời và có hiệu quả